

カリオグラムの指標

※小児は年齢に関わらず発育段階の差が大きいことから、年齢別の正確な指標は持ち合わせておりません。
下記の指標は、10~11歳を対象とした研究データを目安にしています

因子	スコア	大人	小児 / 乳歯	
う蝕経験	0	う蝕無し・充填物なし	小児のDMFT/dftの算出・判定は、各医院様におまかせしております。 こちらのQRコードを参考にしてみてください 	
	1	普通より良好		
	2	該当年齢として普通		
	3	普通より多い(過去1年間に新しいう蝕ができている場合)		
関連全身疾患	0	疾患なし (う蝕に関連のある重要な全身疾患の兆候は見られない)		
	1	疾患やその状態が軽い (短期的に口渇のある薬剤を服用している場合) (例) 視力低下・運動困難		
	2	重度で長期間 (長期的に口渇のある薬剤を服用している場合、寝たきり、自己免疫疾患、頭頸部への放射線治療など)		
食事内容 (ラクトバチラス菌)	0	LBクラス 0 (1,000 CFU/ml以下)		
	1	LBクラス 1 (10,000 CFU/ml以下)		
	2	LBクラス 2 (100,000 CFU/ml以下)		
	3	LBクラス 3 (1,000,000 CFU/ml以下)		
飲食回数	0	1日3回まで		
	1	1日4-5回まで		
	2	1日6-7回まで		
	3	1日8回以上		
プラーク量	0	非常によい衛生状態 (PII 0.4未満 / PCR 5%以下)		
	1	よい衛生状態 (PII 0.4~1.0 / PCR 6~20%以下)		
	2	よいとは言えない衛生状態 (PII 1.1~2.0 / PCR 21~50%以下)		
	3	不良な衛生状態 (PII 2.1以上 / PCR 51%以上)		
ミュータンス菌	0	SMクラス 0 (10,000 CFU/ml以下)		
	1	SMクラス 1 (100,000 CFU/ml以下)		
	2	SMクラス 2 (100,000~1,000,000 CFU/ml)		
	3	SMクラス 3 (1,000,000 CFU/ml以上)		
フッ化物物 プログラム	0	フッ化物配合歯磨剤に加えて、常時複数のフッ化物を使用している		
	1	フッ化物配合歯磨剤に加えて、いくつかのフッ化物をときどき使用している		
	2	フッ化物の入った歯磨剤のみ、その他はなし		
	3	フッ化物は使用しない、歯磨剤もフッ化物なし		
唾液分泌速度	0	正常な唾液分泌速度 1.1ml/分より多い	0.7ml/分より多い	※唾液がうまく吐き出せない場合は判定不可
	1	低い、唾液分泌速度 0.9~1.1ml/分	0.3~0.7ml/分	
	2	低い、唾液分泌速度 0.5~0.9ml/分未満	0.3ml/分未満	
	3	非常に低い、無唾液症、 <0.5ml/分未満、長期間		
緩衝液能	0	デントバフストリップス 青 (ph6.0以上)		
	1	デントバフストリップス 緑 (ph4.5~5.5)		
	2	デントバフストリップス 黄 (ph4.0以下)		